

## 症例集 - 前歯セラミック被せ物

治療前



治療後



年齢・性別	70代、女性	
主訴	前歯の被せ物を治したい	
治療法	ジルコニアセラミック治療	
治療期間	1. 被せ物の型取り→(1週間)→2. 試し合わせ (FGP テクニック) →(1週間)→3. 被せ物の装着で約3週間。来院回数：最低3回	
治療の説明	虫歯や怪我で欠けた歯をセラミックの材料で治療する方法です。天然の歯に近い色調を表現できます。 体への害が少ない 表面に着色しにくい	
治療のリスク	歯を削る必要があり、場合によっては、神経を取ることもあります。陶材のため、欠ける、あるいは破損する恐れがあります。	
	メリット	主なデメリット・副作用
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・透明感がある</li> <li>・自然の歯の形態に近い</li> <li>・変色がない</li> <li>・適合が良い</li> <li>・アレルギーが少ない</li> <li>・削れない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・金属に比べ、欠ける可能性がある</li> <li>・費用がかかる</li> </ul>

治療費用	<b>115,000 円 (税込)</b> ※北米式歯内療法を用いた場合は 165,000 円
------	---